



Pflanzen
Agroscope Technische Blätter | N° 19 / 2017
Varietätenblatt | Hafer

Ebène

Avena sativa L.

Herkunftsland: Frankreich

Passangaben

Sortenname: Ebène
Sortenstatus: Moderne Sorte
Region:
Akzessionsnummer: AV0003
Akzessionname: Ebène
Aufnahmedatum: 1998
Gebername: Perenchies Serasem
Recherche et Sélections
Gebernummer:
Bemerkungen: Standardsorte
(Schwarzhafer)



Physiologische Charakterisierung

Evaluierung: Agroscope Charline Daujat 2015
Prangins CH: Rives (380m) 462339N/0061456E

Wechselverhalten: Printemps
Reifezeit: 145
Standfestigkeit: Niedrig
Länge: 100cm
TKG: 25.9

Technische Werte

Analysen: Agroscope Charline Daujat/Charlotte Martin 2016
Prangins CH: Rives (380m) 462339N/0061456E

Proteingehalt (%): 13.19
Hektolitergewicht (kg/hl): 57.96
Korn Länge/Breite (mm): 9.53/2.9
Spelzengehal (%): 29.68
B-Glucangehalt (%): 6.15
Mycotoxingehalt:

Krankheitsanfälligkeit

Vermerk:

Puccinia coronata:

Puccinia graminis:

Besondere Bemerkungen



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Federal Department of Economic Affairs,
Education and Research EAER
Agroscope

Morphologische Charakterisierung¹

Beschreibung: Agroscope Charline Daujat 2015
Prangins CH: Rives (380m) 462339N/0061456E

Vegetativ

Code	Deskriptoren	Bemerkungen	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.6.	Halmdicke	in Relation zu Referenzsorten ²				X						
4.1.7.	Behaarung am Halmknoten		X									
4.1.8.	Winkel des Fahnenblattes zum Halm				X							
4.1.9.	Steifheit des Fahnenblattes							X				
4.1.10.	Winkel der Blätter zum Halm	Andere als Flahnenblatt			X							
4.1.11.	Steifheit der Blätter	Andere als Flahnenblatt						X				
4.1.12.	Haarigkeit der Blatthülle	untere Blätter						X				
4.1.13.	Behaarung des Blattrandes	Blatt unter dem Fahnenblatt						X				
6.1.1.	Länge des zweiten Blattes von oben	in Relation zu Referenzsorten ²					X					
6.1.2.	Breite des zweiten Blattes von oben	Am breitesten Bereich und in Bezug auf Referenzsorten ²						X				
6.1.3.	Anzahl der Seitentriebe	in Relation zu Referenzsorten ²							X			
6.1.4.	Anzahl der fruchtbaren Seitentriebe	in Relation zu Referenzsorten ²					X					
6.1.5.	Standfestigkeit im unreifen Stadium					X						
6.1.6.	Standfestigkeit im reifen Stadium					X						

Rispen und Korn

Code	Deskriptoren	Bemerkungen	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2.3.	Winkel der Hauptäste zur Spindel				X							
4.2.4.	Steifheit von Ährchen					X						
6.2.3.	Reife und Stroh	Zusammenhang zwischen Reife von Getreide und Stroh				X						
4.3.2.	Behaarung auf dem Rücken der Deckspelze							X				
4.3.8.	Primärkornbasisbehaarung									X		
6.3.1.	Herausfallen der Körner bei Reife	Kultivierte Formen				X						
4.3.4.	Begrannung	Registriert am Grund der Randblüte						X				



Ährchenfarbe³



Blattfarbe³



Strohfarbe³

Form der Blütenrispe: Gleichseitigen

Wachsigkeit der Blütenrispe: Nein

Anzahl Körner in der Blütenrispe: 70

Anzahl Körner pro Ährchen: 2

Bespelzung: Ya

Deckspelzenfarbe: Schwarz

Grannenform: Recht

Ansatzstelle der Grannen: > 1/2 des Basis

Impressum

Herausgeber: Agroscope
Route de Duillier 50
1260 Nyon 1
www.agroscope.ch

Copyright: © Agroscope 2017

¹ Deskriptoren des IBPGR Dokument "Oat descriptors", Rome 1985.

² Referenzsorten: Expander, Ebène and Triton.

³ Skala aus "Kriterien der Getreidearten einschließlich Mais und ihre Bewertung zur Sortenidentifizierung", Dr. R. Milatz, 1970.