



Pflanzen
Agroscope Technische Blätter | N° 22 / 2017
Varietätenblatt | Hafer

Dakar

Avena sativa L.

Herkunftsland: Frankreich

Passangaben

Sortenname: Dakar
Sortenstatus: Moderne Sorte
Region:
Akzessionsnummer: AV0017
Akzessionsname: Dakar
Aufnahmedatum: 2009
Gebername: Etablissements Lemaire-
Deffontaines
Gebernummer:
Bemerkungen: Standardsorte



Physiologische Charakterisierung

Evaluierung: Agroscope Charline Daujat 2015
Prangins CH: Rives (380m) 462339N/0061456E

Wechselverhalten: Sommer
Reifezeit: 141
Standfestigkeit: Nul
Länge: 95cm
TKG: 25.23

Technische Werte

Analysen: Agroscope Charline Daujat/Charlotte Martin 2016
Prangins CH: Rives (380m) 462339N/0061456E

Proteingehalt (%):
Hektolitergewicht (kg/hl): 59.61
Korn Länge/Breite (mm): 9.33/2.83
Spelzengehalt (%):
 β -Glucangehalt (%):
Mykotoxingehalt:

Krankheitsanfälligkeit

Vermerk:

Puccinia coronata:

Puccinia graminis:

Besondere Bemerkungen



Morphologische Charakterisierung¹

Beschreibung: Agroscope Charline Daujat 2015

Prangins CH: Rives (380m) 462339N/0061456E

Vegetativ

Code	Deskriptoren	Bemerkungen	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.6.	Halmdicke	in Relation zu Referenzsorten ²						X				
4.1.7.	Behaarung am Halmknoten		X									
4.1.8.	Winkel des Fahnenblattes zum Halm				X							
4.1.9.	Steifheit des Fahnenblattes							X				
4.1.10.	Winkel der Blätter zum Halm	Andere als Fahnenblatt				X						
4.1.11.	Steifheit der Blätter	Andere als Fahnenblatt				X						
4.1.12.	Haarigkeit der Blatthülle	untere Blätter						X				
4.1.13.	Behaarung des Blattrandes	Blatt unter dem Fahnenblatt				X						
6.1.1.	Länge des zweiten Blattes von oben	in Relation zu Referenzsorten ²	X									
6.1.2.	Breite des zweiten Blattes von oben	An der breitesten Stelle und in Bezug auf Referenzsorten ²						X				
6.1.3.	Anzahl der Seitentriebe	in Relation zu Referenzsorten ²								X		
6.1.4.	Anzahl der fruchtbaren Seitentriebe	in Relation zu Referenzsorten ²					X					
6.1.5.	Standfestigkeit im unreifen Stadium		X									
6.1.6.	Standfestigkeit im reifen Stadium				X							

Rispen und Korn

Code	Deskriptoren	Bemerkungen	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2.3.	Winkel der Hauptäste zur Spindel				X							
4.2.4.	Steifheit von Ährchen					X						
6.2.3.	Reife und Stroh	Zusammenhang zwischen Reife von Getreide und Stroh						X				
4.3.2.	Behaarung auf dem Rücken der Deckspelze									X		
4.3.8.	Primärkornbasisbehaarung									X		
6.3.1.	Herausfallen der Körner bei Reife	Kultivierte Formen						X				
4.3.4.	Begrannung	Am Grund der Randblüte notiert	X									



Ährenfarbe³



Blattfarbe³



Strohfarbe³

Form der Blütenrispe: gleichseitig

Wachsigkeit der Blütenrispe: Nein

Anzahl Körner pro Blütenrispe: 78

Anzahl Körner pro Ähren: 2

Bespelzung: Ja

Deckspelzenfarbe: schwarz

Grannenform: /

Ansatzstelle der Grannen: /

Impressum

Herausgeber: Agroscope
Route de Duillier 50
1260 Nyon 1
www.agroscope.ch

Copyright: © Agroscope 2017

¹ Deskriptoren des IBPGR Dokument "Oat descriptors", Rome 1985.

² Referenzsorten: Expander, Ebène and Triton.

³ Skala aus "Kriterien der Getreidearten einschließlich Mais und ihre Bewertung zur Sortenidentifizierung", Dr. R. Milatz, 1970.