


Bonituren

NAP 03-85 Tomaten Anbau 2007

Accenname: König Humbert Accenumb: GE-1202 Instcode: PSR



Kalenderwoche	Ertrag in kg	Anzahl Früchte	Durchschnittliches Gewicht in Gramm
30	1.144	29	39
31	2.042	49	42
32	0.304	9	34
33	0.92	27	34
34	0.3	9	33
35	0.575	18	32
Summe	5.285	141	37

Frucht-grösse 1-9	Verhältnis Länge/Durch- messer Boniturnote 1-9	Form im Längs- schnitt 1-10	Rippung am Stielende 1-9	Querschnitt 1-2	Einsenkung am Stielende 1-9
1 sehr klein 3 klein 5 mittel 7 gross 9 sehr gross	1 sehr klein 3 klein 5 mittel 7 gross 9 sehr gross	1 abgeflacht 2 leicht abgeflacht 3 kreisförmig 4 rechteckig 5 zylindrisch 6 elliptisch 7 herzförmig 8 verkehrt eiförmig 9 eiförmig 10 birnenförmig	1 fehlend oder sehr gering 3 gering 5 mittel 7 stark 9 sehr stark	1 nicht rund 2 rund	1 fehlend oder sehr gering 3 gering 5 mittel 7 stark 9 sehr stark
3	7	9	1	2	1

Form am Blütenende 1-5	Anzahl Kammern 1-5	Farbe bei Reife 1-6	Festigkeit 1-9	Reifezeit 1-9	Zuckergehalt 3-7
1 eingesenkt 2 eingesenkt bis flach 3 flach 4 flach bis spitz 5 spitz	1 nur zwei 2 zwei oder 3 3 drei oder 4 4 fünf oder 6 5 mehr als sechs	1 cremfarben 2 gelb 3 orange 4 rosa 5 rot 6 bräunlich	1 sehr weich 3 weich 5 mittel 7 fest 9 sehr fest	1 sehr früh 3 früh 5 mittel 7 spät 9 sehr spät	3 weniger süss 5 mittel 7 eher süss
3	1	5	0	5	1

Accenname: König Humbert Accenumb: GE-1202 Instcode: PSR

Bemerkungen:

Sehr ähnlich wie Roi Humbert. Die abweichenden Merkmale sind minim. Die Form am Blütenende ist etwas flacher als bei Roi Humbert.

Erhaltungstatus: **B****Empfehlung:**

Ramschen mit Nr. 13 (Roi Humbert)

Keimpflanze, Pflanze, Stängel, Blatt

Keimpflanze Anthocyan- Färbung des Hypokotyls 1-9	Pflanze Wuchstyp 1-2	Pflanze Anzahl Blütenstände am Haupttrieb 3-7	Stängel Anthocyanfärbung des oberen Drittels 1-9	Blatt Stellung des Blattstiels im Verhältnis zur Hauptachse 3-7
1 fehlend 9 vorhanden	1 begrenzt wachsend 2 unbegrenzt wachsend	3 gering 5 mittel 7 gross	1 fehlend oder sehr gering 3 gering 5 mittel 7 stark 9 sehr stark	3 halbaufrecht 5 waagrecht 7 halb überhängend
9	2	7	1	5

Blatt

Länge 3-7	Breite 3-7	Fiederung 1-2	Grösse der Blattfiedern 1-9	Intensität der Grünfärbung 3-7
3 kurz 5 mittel 7 lang	3 schmal 5 mittel 7 breit	1 gefiedert 2 doppelt gefiedert	1 sehr klein 3 klein, 5 mittel 7 gross, 9 sehr gross	3 hell 5 mittel 7 dunkel
3	3	2	3	5

Blatt, Blüte

Glanz 3-7	Blasigkeit 3-7	Grösse der Blasen 3-7	Blütenstand Typ (2. und 3. Blütenstand) 1-3	Verbänderung (e. Blüte der Blütenstände) 1-9
3 gering 5 mittel 7 stark	3 gering 5 mittel 7 stark	3 klein 5 mittel 7 gross	1 überwiegend unverzweigt 2 intermediär 3 überwiegend verzweigt	1 fehlend 9 vorhanden
5	5	1	1	9

Blüte

Behaarung des Griffels 1-9	Farbe 1-2	Blütenstandsstiel: Bruchstelle 1-9	Blütenstandsstiel Länge 3-7
1 fehlend 9 vorhanden	1 gelb 2 orange	1 fehlend 9 vorhanden	3 kurz 5 mittel 7 lang
9	1	3	3