



Chou rouge «ZEFA Kleinfein» (*Brassica oleracea* L. var. *capitata* L.f. *rubra* (L.) The)

Obtenteur: Station fédérale de recherches en arboriculture, viticulture et horticulture, 8820 Wädenswil
Représentant: (DSP) Delley semences et plantes SA, 1567 Delley

Origine et travaux de sélection

Provient du croisement entre le chou «montagne» et diverses variétés de choux rouges. Croisements de différentes plantes avec examen de la descendance. Sélection de 3 lignées caractéristiques et clonage de ces lignées. Les plantes mères sont maintenues à l'état végétatif.

La variété obtient la protection variétale en 1995.

Caractères morphologiques

Pied: moyennement long, fin

Feuilles extérieures (manchettes): moyennes à grandes, violet clair avec des reflets verdâtre, cire peu importante.

Empilement des feuilles: dense

Feuilles de recouvrement: violet foncé

Feuilles de la tête: violet (très foncé)

Forme de la pomme: elliptique large

«Tronc» (attache des feuilles): moyen

Caractères agronomiques

Rendement

Moyen

On peut produire, selon les distances de plantation, des têtes dont le poids varie de moins de 300 g à plus de 1500 g.

Homogénéité

Forme de la tête: très bonne
Grandeur de la tête: moyenne

Eclatement

Eclate relativement tard après la maturité.

Directives culturales

Utilisation

En culture professionnelle pour le marché du frais et pour une conservation limitée.

Cependant «ZEFA Kleinfein» se prête particulièrement bien pour la culture dans les jardins familiaux.

Avec des distances de plantation resserrées (40x30 cm) on produit des minis choux avec des pommes d'un poids pouvant être inférieur à 300 g.

Semis

De mi à fin mai.

Indications pour la plantation

Culture normale: 50x30 à 50x40 cm

Culture de chou «mini»: 40x30 cm

Protection des plantes

Utiliser uniquement des semences traitées. Faire la pépinière dans un sol désinfecté.

Le chou rouge «ZEFA klein» est sensible aux mêmes parasites que les autres crucifères. Il convient de surveiller attentivement le développement des ravageurs, en particulier les altises, les tipules, les vers gris, les larves de la piéride du chou, la noctuelle du chou et le puceron cendré du chou.

Récolte

Récolte mi-précoce.

Elaboré par la Station fédérale de recherches de Wädenswil (Hp. Buser);
Trad.: F. Fournier, DSP, octobre 1995.



Das «Kraut» ist von dunkel-violetter Färbung.
Le feuillage est violet foncé.



Schnitt eines Kopfes.
Coupe d'une pomme.